

40 ЛЕТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СПИДУ

1981 г.

• 5 июня Центры по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКЗ) опубликовали **первый официальный отчет о том, что впоследствии назовут эпидемией ВИЧ**



1982 г.

• Впервые выявлен синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД)

2001 г.

• Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по ВИЧ/СПИДу. • **(ССГАООН)** – 189 государств-членов подписали Декларацию об обязательствах. • Подписанное в Дохе соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (**ТРИПС**), которое поддерживает общественное здравоохранение. • Государства – члены Африканского союза обязуются выделять не менее **15 % годового бюджета на улучшение здравоохранения**



2000 г.

• **Резолюция Совета безопасности ООН 1308:** проблема здравоохранения впервые названа угрозой безопасности. • Декларация тысячелетия и запуск **Целей развития тысячелетия**

2002 г.

• Создан **Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией**. • **300 000 человек в развивающихся странах получают лечение**



2003 г.



• ВОЗ и ЮНЭЙДС запустили инициативу «**3 x 5**» – довести количество человек в развивающихся странах, которые получают антиретровирусное лечение, до 3 миллионов к 2005 году. • **Создана организация Чрезвычайного плана Президента США для оказания помощи в связи со СПИДом (ПЕПФАР)**. Финансирование на сумму 15 млрд долларов США в течение пяти лет стало крупнейшим единовременным обязательством по финансированию лечения заболевания в истории

PrEP

2010 г.

• Исследование iPrEx среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, в 6 странах выявило **снижение риска передачи ВИЧ на 44 %** среди тех, кто ежедневно принимает таблетку тенофовира / эмтрицитабина. • **Новая цель ЮНЭЙДС:** нулевое количество новых случаев инфицирования ВИЧ, нулевая дискриминация и нулевая смертность от СПИДа

2012 г.



• ЮНЭЙДС/ВОЗ выпустили **рекомендации** по антиретровирусной терапии в качестве средства профилактики для серодискордантных пар



2013 г.

• **Доконтактная профилактика** одобрена для использования людьми с негативным ВИЧ-статусом

2015 г.



• Цель устойчивого развития – положить конец эпидемии СПИДа как угрозе общественному здоровью к 2030 году. • Куба стала первой страной, где удалось полностью искоренить **новые случаи инфицирования ВИЧ среди детей**

2016 г.

• Рекомендации по тестированию и лечению для всех людей, живущих с ВИЧ

1981 1982 1982-3 1983 1984 1985 1986 1987 1991-93 1994 1996 1997 1998 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2018 2019 2020 2021

1982–83 гг.

• Во многих развитых странах организованы **меры реагирования среди сообщества геев**



1983 г.

• **Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ)** назван причиной СПИДа



1984 г.

• В Африке выявлена эпидемия СПИДа среди гетеросексуалов



1985 г.

• Появляется **первый тест на антитела к ВИЧ**



1987 г.

• **Первое лекарство от СПИДа** – зидовудин, или АЗТ – одобрено для использования в США

1986 г.

• Глобальная сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИДом (**GNP+**), а затем международный. • Руководящий комитет организации людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, запускают **программы обмена шприцев** для снижения скорости распространения ВИЧ в Австралии, Нидерландах и Великобритании



1991–93 гг.

• Распространенность ВИЧ среди молодых беременных женщин в Уганде и молодых мужчин в Таиланде начинает снижаться – это **первое серьезное снижение темпов эпидемии в развивающихся странах**

ЮНЭЙДС

1996 г.

• **Начало комбинированного лечения** как минимум тремя антиретровирусными препаратами. • **Создание ЮНЭЙДС**



1994 г.

• Ученые разрабатывают **первую схему лечения для снижения риска передачи ВИЧ от матери ребенку**. • Парижская встреча, посвященная принципу «Повышение вовлеченности людей со СПИДом» (**GIPA**)



1997 г.

• **Бразилия** становится первой развивающейся страной, которая **предоставляет антиретровирусную терапию через систему общественного здравоохранения**. • Количество **новых случаев инфицирования в год достигло почти 3,2 млн** [3,0–3,5 млн]

1998 г.

• Использование антиретровирусной терапии для профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку (**ПМР**) оказалось эффективным в условиях нехватки ресурсов и рекомендовано для внедрения по всему миру

2005 г.

• **Обязательство «Большой восьмерки»** по обеспечению всеобщего доступа к лечению.

2006 г.

• Страны – члены ООН обязуются обеспечить **всеобщий доступ к услугам профилактики, лечения, ухода и поддержки**

2007 г.

• ЮНЭЙДС и ВОЗ рекомендуют **добровольное медицинское обрезание мужчин** в условиях высокой распространенности ВИЧ

2009 г.

• Рост количества доказательств того, что раннее начало **антиретровирусной терапии снижает уровень заболеваемости и смертности в связи с ВИЧ** и туберкулезом, а также снижает риск передачи ВИЧ и туберкулеза

2011 г.

• Резолюция Совета безопасности ООН 1883, признающая смертоносную **связь между ВИЧ и насилием** в отношении женщин во время военных конфликтов и в постконфликтных условиях. • Политическая декларация Генеральной Ассамблеи ООН по ВИЧ/СПИДу: страны – члены ООН вновь поддерживают идею всеобщего доступа и устанавливают цели по изменению курса эпидемии к 2015 году. • **Запуск глобального плана по предотвращению новых случаев ВИЧ-инфицирования среди детей к 2015 году и сохранению жизни их матерей**. • Исследование HPTN 052 показывает, что **антиретровирусная терапия снижает риск передачи ВИЧ-инфекции у серодискордантных пар на 96 %**



2018 г.

• Вагинальное кольцо, высвобождающее антиретровирусные препараты длительного действия для предотвращения ВИЧ, показало свою 50% эффективность



2019 г.

• Долгосрочные инъекции, направленные на защиту женщин от ВИЧ, подтвердили свою эффективность

2020 г.

• **27,4 млн человек получают лечение, 1,5 млн новых случаев инфицирования ВИЧ**

2021 г.

• **Принята новая глобальная стратегия по СПИДу с упором на искоренение неравенства для прекращения эпидемии СПИДа**

